




Situation Blattläuse Zuckerrüben

Mittlerweile findet man in sehr vielen Bestände die schwarze Bohnenblattlaus, sehr oft über der Schadschwelle von 30% befallener Pflanzen vor Reihenschluss. Die grüne Pflirsichblattlaus hingegen ist noch nicht groß in Erscheinung getreten. Die Witterung der nächsten Tage wird die Populationen jedoch explodieren lassen, so dass eine erste Behandlung zeitnah durchgeführt werden sollte. Unsere Empfehlung jetzt zu dem frühen Termin:

300 g/ha Pirimor G

Blattlausmonitoring (Stand 25.04.25)



Situation in Winterweizen

Das Infektionspotential der letzten Woche war teilweise recht hoch. Neben den Rosten waren auch Infektionsbedingungen für Septoria bei 48h Blattnässe durchaus gegeben und in den kommenden Tagen kann es durchaus zu Infektionen mit Mehltau kommen. Da mittlerweile auch der spät gesäte Weizen das Stadium 31/32 erreicht hat, sollte, wo noch nicht geschehen, die T1-Maßnahme gesetzt werden. Unsere Empfehlung:

Talius Pro 0,8 l/ha oder Forapro 1,0 l/ha oder Delaro Forte 1,25 l/ha

Mit einer angepassten Wachstumsreglermaßnahme kombiniert!

