



Aktuelle Stunde am Versuchsfeld Nörvenich

Am **Donnerstag, 09.04.26** starten wir mit unseren **Feldbegehungen in Nörvenich**. Los geht es um 9 Uhr am Versuchsfeld. Danach wird unsere **Aktuelle Stunde alle 14 Tage mittwochs, jeweils um 9 Uhr angeboten** (22.04. und 06.05.). Wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam die gegenwärtigen Themen im Feld zu besprechen!



Die Osterfeiertage stehen vor der Tür – bitte denken Sie rechtzeitig an Ihre Futterbestellung

Sollten Sie noch vor den Ostertagen Bedarf haben, benötigen wir Ihre Bestellung bis spätestens 30.03.2026 um eine reibungslose Versorgung sicherzustellen. Vielen Dank!

Wetter kurz und knapp:

Der 14-Tage Trend sagt deutlich kühleres und stellenweise windiges Wetter voraus; bis Mitte kommender Woche auch mit Niederschlägen. Ab dem Monatswechsel weiterhin kühler, aber trocken.

Wintergerste:

Frühe Wintergerstensorten/frühe Septembersaaten befinden sich **im Moment in BBCH 31/32, das Gros hat derzeit BBCH 29/30 erreicht und steht ab Mitte kommender Woche bzw. ab Ostern zur Behandlung an**. Achten Sie darauf, dass zum Behandlungstermin BBCH 31/32 sicher erreicht ist, um den maximalen Erfolg der WR – Maßnahme sicherzustellen. Als wirtschaftliche gemeinsame Ausbringung hat sich über die vergangenen Jahre eine Kombination aus Wachstumsregler und Fungizid bewährt. Derzeit ist Mehltau, Zwergrost und Rynchosporium zu beobachten. Die momentan eher kühle Witterung bremst zurzeit die Krankheitsausbreitung. Ab Mitte kommender Woche ist davon auszugehen, dass sich der Druck mit steigenden/milderen Temperaturen erhöht. Halten Sie Ihre Bestände in jedem Fall im Blick.

Unsere Fungizid - Handlungsempfehlungen zu BBCH 31/32:

1,0 – 1,25 l/ha Delaro Forte

oder

0,65 – 0,8 l/ha Talius Pro

Delaro Forte schützt mit der Dreifachkombination von Prothioconazol, Spiroxamin und Trifloxystrobin zuverlässig Ihren Gerstenbestand. Die SDHI-freie Wirkstoffkombination ist darüber hinaus eine wichtige Ergänzung und starke Alternative im Resistenzmanagement. Stark bei Netzflecken, Zwergrost.

Talius Pro ist ein breitwirksames Fungizid mit der Wirkstoffkombination Prothioconazol + dem Wirkstoff Proquinazid aus dem Talius. Mit Talius Pro bekämpfen Sie alle frühen Krankheiten (Netzflecken, Rynchosporium, Septoria und Mehltau vorbeugend) in Weizen und Gerste!



Gleichzeitig zur 1. Fungizidmaßnahme empfiehlt sich die **Hinzumischung eines Wachstumsreglers**. Als Wachstumsregler bei eher kühlen Bedingungen empfehlen wir **Prodax** (Kombinationsprodukt aus Trinexapac und Prohexadion). Bei beständigeren Tagestemperaturen >12°C und strahlungsreicherem, helleren Wetter kann natürlich auch mit einem Trinexapac – Produkt gut und sicher eingekürzt werden.

Unsere Empfehlung auf Normalstandorten für lageranfällige Sorten lautet:

Moxa / Countdown NT 0,6 l/ha

oder

Prodax 0,6 kg/ha

oder

BetaSil 1,0 l/ha +

Moxa / Countdown NT 0,4 l/ha

Sommertrockene Standorte und standfeste Sorten: Reduktion der Aufwandmengen um 20%!

BetaSil ist eine Biostimulanz, die für hohe Qualität und stabile Erträge sorgt. Die Biostimulanz enthält Silizium zur Förderung starken Pflanzengewebes und Glycin Betain. BetaSil dringt in die Zellwände der Pflanze ein und stabilisiert das Zellgerüst, wodurch die **Standfestigkeit und Widerstandskräfte gestärkt** werden.

Eine ausreichende **Mikronährstoffversorgung** (v.a. Mangan, Kupfer, Zink, Eisen, Molybdän) wird über die Zugabe von **0,5-1 kg/ha Microfol Combi** oder **1 l/ha Multiple Pro** erreicht! Das in Multiple Pro enthaltene Mangancarbonat gewährleistet eine kontinuierliche Freigabe und langanhaltende Wirkung.

Multiple Pro (Mn-, Cu-, Zn-, Mg- Suspension) eignet sich hervorragend für eine Blattdüngung mit Mangan. Zudem ist Kupfer am Ligninaufbau beteiligt und steigert zusätzlich die Widerstandsfähigkeit gegenüber pilzlichen und bakteriellen Schaderregern. Magnesium steigert unter anderem die Photosyntheseleistung der Pflanzen und Zink ist bedeutsam für die Struktur und Funktion der Zellwände und mindert Umweltstress.

Planen Sie um die Monatswende März/April eine pflanzenverfügbare Stickstoffversorgung von 120 – 130 kg N/ha ein.

Sommergetreide - Herbizide

Das Gros der Sommergetreide wurde im März gesät, demnächst steht die Herbizidmaßnahme an. In Sommergerste und Sommerweizen empfiehlt sich zur Bekämpfung von **Windhalm und Flughafer Axial 50*** mit **0,9 l/ha**; gegen **Ackerfuchsschwanz und Weidelgräser 1,2 l/ha Axial 50***.

Sollten noch Zweikeimblättrige bekämpft werden, ist dies zu einem späteren Termin mit **Zypar 1,0 l/ha** oder **Onmera LQM** 1,0 l/ha** möglich.

* keine Empfehlung in AHL pur

** keine Mischung mit Medax Top, Prodax, oder Ethephon-haltigen Produkten